Post-Vac Symptome

Post-Vac ist gekennzeichnet durch:

- die andauernde Produktion von Spike-Proteinen (Spikeopathie).
  Diese ist meist verbunden mit einem Autoimmungeschehen.
- Autoimmungeschehen ohne Spikeopathie ist möglich
- Schädigung der kleinsten Gefäße (Kapillaren) und damit verbunden die Schädigung der von diesen versorgten Organen
- Schädigung oder Schwächung des Immunsystems

Typische Symptome der Post-Vac-Erkrankung (nach modRNA-basierter Injektion), auch viele Jahre danach:
Verstärkung bereits bestehender Allergien (Neurodermitis, Asthma, Heuschnupfen, …)
Atemnot bei Belastung
Auftreten oder Verstärkung einer sog. Autoimmunkrankheit (Diabetes, Rheuma, Neurodermitis, Schuppenflechte, Multiple Sklerose, Schilddrüsenentzündung, …)
Blutungsneigung innerlich und äußerlich
Erschöpfungssyndrom
Gangunsicherheit
Gefühlsstörungen, besonders der Beine
Gelenkschmerzen, Sehnenschmerzen
Geruchs- oder Geschmacksstörungen
Gesichtslähmung
Gleichgewichtsstörung
Gürtelrose
Starker Haarausfall (allgemein oder kreisrund)
Anzeichen einer Herzmuskelentzündung (Brustschmerzen, Atemnot, Herzstolpern, …)
Herzinfarkt
Hörstörungen (Hörverlust, Ohrgeräusch, …)
Infektanfälligkeit, verzögerte Genesung nach Infekten
Wiederaufflammen früherer Infekte (Gürtelrose, Tuberkulose, Pfeiffer’sches Drüsenfieber, Borreliose, Herpesviren…)
Kopfschmerzen
Neu- oder Wiederauftreten von schnell wachsendem Krebs oder gutartigen Tumoren
Lähmungen
Menstruationsstörungen, Fehlgeburten, Unfruchtbarkeit (Mann/Frau)
Müdigkeit
Muskelschmerzen
Nesselsucht
Ohnmacht
Schlaganfall
Anzeichen einer Thrombose (Beinvenen, Augen, Gehirn, Ohren, …)
Wortfindungsstörungen, Vergesslichkeit, Konzentrationsstörung
Wundheilungsstörungen
Zahnprobleme